arXiv:math/0505592v1 [math.AG] 26 May 2005

Détermination du rang des tissus du plan et autres invariants géométriques

Olivier Ripoll

Octobre 2004

Résumé :
Soit $\mathcal{W}(d)$ un d-tissu non singulier du plan présenté par une équation différentielle du premier ordre à coefficients dans $\mathbb{C}\{x,y\}$ de la forme

$$F(x,y,y') := a_0(x,y)\cdot(y')^d + a_1(x,y)\cdot(y')^{d-1} + \cdots + a_d(x,y) = 0,$$

avec $d \geq 3$ et dont on note (E,∇) sa connexion associée. Nous montrons que la trace de la courbure de (E,∇) est la somme des courbures de Blaschke des 3-tissus extraits. En outre nous indiquons comment la courbure rend compte de la linéarisabilité du tissu $\mathcal{W}(d)$. Notre résultat principal est un procédé explicite de détermination pour d quelconque du rang de $\mathcal{W}(d)$, à partir des coefficients de F. En application, nous retrouvons égalemment des résultats connus en géométrie des tissus.

Abstract :
Let $\mathcal{W}(d)$ be a non singular d-web in the plane with $d \geq 3$, presented by a first order differential equation of the type $F(x,y,y') := a_0(x,y)\cdot(y')^d + a_1(x,y)\cdot(y')^{d-1} + \cdots + a_d(x,y) = 0$, where $a_i \in \mathbb{C}\{x,y\}$ and let (E,∇) be the connection associated to F. We show that the trace of its curvature is the sum of the Blaschke curvatures of extracted 3-webs of $\mathcal{W}(d)$. Our main result is an explicit determination of the rank of $\mathcal{W}(d)$. We also recover some well known results in web geometry.

Abridged english version

Let $\mathcal{W}(d)$ be a non singular d-web in $(\mathbb{C}^2,0)$, *presented* by a first order differential equation with analytic coefficients

$$F(x,y,y') := a_0(x,y)\cdot(y')^d + a_1(x,y)\cdot(y')^{d-1} + \cdots + a_d(x,y) = 0.$$

This *implicit* presentation leads to an explicit study of some invariants of the web $\mathcal{W}(d)$ as the rank, and fits in with the geometric study of differential equations.

Using the connection (E,∇) associated to F and introduced in [4], we can first interpret some of the coefficients of its curvature matrix.

We prove for at least $d = 4\,,5$ and 6, that the *Blaschke-Chern curvature* of $\mathcal{W}(d)$, which is the trace of the curvature K of (E,∇), is an invariant of the web, *i.e.* it only depends on the web and not on the presentation chosen. Furthermore, we have the following theorem

Theorem 1. (Trace formula) *The Blaschke-Chern curvature of a d-web $\mathcal{W}(d)$ is the sum of all the Blaschke curvatures of extracted 3-webs of $\mathcal{W}(d)$, for at least $d = 4\,,5$ and 6.*

Interpreting the coefficients of the connection matrix in any adapted basis, we can show that for a non singular planar 4-web, there exists an adapted basis where the following expression of the curvature matrix holds :

$$K = \begin{pmatrix} k_1 & \partial_x(k_1) + L_1 & \partial_y(k_1) + L_2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} dx \wedge dy$$

where $L_1 = L_2 = 0$ are the conditions for a 4-web to be linearisable (*cf.* [3]). Hence we can deduce from this the Poincaré theorem : *A* 4*-web of maximal rank is linearisable.*

In the classical case where two families of leaves of $\mathcal{W}(4)$ are respectively given by $x = const.$ and by $y = const.$, the previous methods still hold and we get an explicit expression of the coefficients of the curvature matrix, involving the Blaschke curvatures of extracted 3-webs. This allows us to prove once again the trace formula and other results.

In the general case of a d-web $\mathcal{W}(d)$, the existence of an adapted basis of (E, ∇) gives just one integrability relation, leading to the construction of a matrix $(k_{m\ell})$ of dimension π_d with coefficients in $\mathbb{C}\{x, y\}$ which gives explicitely the rank of $\mathcal{W}(d)$. Precisely, using the special construction of this matrix, and the fact that $\operatorname{Ker}\nabla$ is a local sytem, we obtain, thanks to Nakayama's lemma, the following result :

Theorem 2. (Determination of the rank of a non singular planar d-web) *The following equality holds :* $\overline{K} := Ker(k_{m\ell}) = \mathcal{O} \otimes_{\mathbb{C}} Ker\nabla$*, and in particular,* $rank\, \mathcal{W}(d) = corank\,(k_{m\ell})$*.*

For instance, this result allows us to recover a weak version of a theorem due to G. Bol : *A hexagonal* 4*-web is of maximal rank.*

1 Introduction à la géométrie des tissus du plan

La géométrie des tissus est consacrée à l'étude des familles de feuilletages en position générale et à leurs invariants.

Soit $\mathcal{O} = \mathbb{C}\{x, y\}$ l'anneau des séries convergentes à coefficients complexes à deux variables. Un d-tissu $\mathcal{W}(d)$ non singulier de $(\mathbb{C}^2, 0)$ est la donnée d'une famille de *feuilles*, germes de courbes de niveau $\{F_i(x, y) = cste\}$ où $F_i \in \mathcal{O}$ vérifie $F_i(0) = 0$ pour tout $1 \leq i \leq d$, et satisfaisant l'hypothèse de position générale

$$dF_i(0) \wedge dF_j(0) \neq 0$$

pour $1 \leq i < j \leq d$. On considère une équation différentielle du premier ordre de la forme (1) suivante :

$$F(x, y, y') := a_0(x, y) \cdot (y')^d + a_1(x, y) \cdot (y')^{d-1} + \cdots + a_d(x, y) = 0 \qquad (1)$$

où $F(x, y, p) \in \mathcal{O}[p]$ est sans facteurs multiples et telle que $a_0 \neq 0$.

On note $R \in \mathcal{O}$ le p-résultant de F avec $R = (-1)^{\frac{d(d-1)}{2}} \cdot a_0 \cdot \Delta$ où Δ est son p-discriminant. En dehors du lieu $\{R = 0\}$, les d courbes intégrales d'une équation différentielle de la forme (1) définissent un d-tissu non singulier, en vertu du théorème de Cauchy. Réciproquement, la donnée d'un d-tissu non singulier de $(\mathbb{C}^2, 0)$ permet de construire, quitte à effectuer un changement de variables, une équation différentielle

$$F(x, y, y') := \prod_{i=1}^{d} (\partial_y(F_i) y' + \partial_x(F_i)) = 0$$

de la forme (1) vérifiant $R(0) \neq 0$ et dont les d solutions au voisinage de 0 ont les pentes $p_i(x, y) := -\partial_x(F_i)/\partial_y(F_i) \in \mathcal{O}$ des feuilles du tissu.

Ainsi, tout tissu du plan est *implicitement présenté* par une équation différentielle de la forme (1), à un inversible près. Cette approche ne privilégie aucune des feuilles du tissu et s'inscrit dans le cadre de l'étude géométrique des équations différentielles. Cette étude sera locale, au voisinage de $0 \in \mathbb{C}^2$ et l'on suppose *désormais* que $R(0) \neq 0$.

• **Invariants des tissus du plan.** Soit $\mathcal{A}(d)$ le $\mathbb{C}$-espace vectoriel des *relations abéliennes* du tissu non singulier $\mathcal{W}(d)$ liant les normales aux feuilles et à coefficients constants sur celles-ci, défini par

$$\mathcal{A}(d) := \big\{(g_1(F_1), \dots g_d(F_d)) \in \mathcal{O}^d \text{ tel que } (g_i)_{i=1\dots d} \in \mathbb{C}\{t\} \text{ et } \sum_{i=1}^{d} g_i(F_i)dF_i = 0\big\}.$$

On a la majoration classique *optimale* suivante :

$$rg\,\mathcal{W}(d) := dim_{\mathbb{C}}\mathcal{A}(d) \leq \pi_d := \tfrac{1}{2}\,(d-1)(d-2)$$

et l'entier $rg\,\mathcal{W}(d)$ défini ci-dessus est un *invariant* du tissu : il ne dépend que de $\mathcal{W}(d)$ et non du choix des fonctions F_i, ou pareillement, de l'équation différentielle qui le présente. On l'appelle le *rang* du tissu non singulier $\mathcal{W}(d)$; nous verrons qu'en général, le rang d'un tissu est nul.

On dit qu'un d-tissu $\mathcal{L}(d)$ est *linéaire* si toutes ses feuilles sont des germes de droites. Un tissu *algébrique* $\mathcal{L}_C(d)$ est un tissu linéaire donné par dualité par une courbe algébrique réduite C de $\mathbb{P}^2$. Si $P(s,t) = 0$ est une équation affine de C, on vérifie que dans un système de coordonnées convenables, le tissu $\mathcal{L}_C(d)$ est présenté par l'équation $F(x,y,p) = P(y - px, y) = 0$. Un théorème d'Abel permet alors de montrer que les tissus algébriques sont de rang maximal π_d.

Dans [2], S. S. Chern et P. A. Griffiths ont d'ailleurs plus largement illustré le lien existant entre la géométrie des tissus et la géométrie algébrique. Cependant, l'existence des tissus du plan *exceptionnels*, qui sont de rang maximal mais non algébrisables, et dont le premier exemple lié à la relation fonctionnelle du dilogarithme fut donné par G. Bol, montre que l'on ne peut réduire l'étude des tissus de rang maximal à celle des courbes algébriques planes (*cf.* [1] et [4] pour des développements récents).

La détermination du rang d'un tissu non singulier quelconque n'était effective que dans le cas d'un 3-tissu $\mathcal{W}(3)$. On sait en effet depuis les travaux de W. Blaschke [1] qu'il existe une 1-forme γ vérifiant la relation $d\omega_i = \gamma\wedge\omega_i$ où $\omega_i = \rho_i dF_i$, avec $\rho_i \in \mathcal{O}^*$ et $\omega_1 + \omega_2 + \omega_3 = 0$. La 2-forme $d\gamma$ est, contrairement à γ, un invariant du tissu appelée *courbure de Blaschke* de $\mathcal{W}(3)$. On a alors l'équivalence suivante : $rg\,\mathcal{W}(3) = 1$ si et seulement si $d\gamma = 0$.

Nous proposons dans cette note une méthode explicite pour déterminer le rang d'un d-tissu du plan non singulier quelconque, ainsi que l'interprétation d'autres invariants du tissu. Notre point de départ sera la connexion associée à un d-tissu introduite par A. Hénaut dans [4] ainsi que les invariants naturels qu'elle engendre.

• **Relations abéliennes *via* l'annulation d'une trace, et connexion associée** (*cf.* [4]). Soient $d \geq 3$ et $\mathcal{W}(d)$ un d-tissu non singulier présenté par F de la forme (1) et $S = \{F(x,y,p) = 0\}$ la surface lisse associée, munie de la projection canonique $\pi : S \longrightarrow (\mathbb{C}^2, 0)$ induite par $(x,y,p) \to (x,y)$.

Soit $(\Omega^\bullet_S, d)$ le complexe de de Rham des formes différentielles sur S. La formule d'interpolation de Lagrange notamment permet de montrer qu'il existe un isomorphisme de $\mathbb{C}$-espaces vectoriels de $\mathcal{A}(d)$ dans

$$\mathfrak{a}_F = \left\{\omega = (b_3 \cdot p^{d-3} + b_4 \cdot p^{d-4} + \cdots + b_d) \cdot \frac{dy - pdx}{\partial_p(F)} \in \pi_*(\Omega^1_S), b_i \in \mathcal{O} \text{ et } d\omega = 0\right\},$$

grâce auquel une relation abélienne est vue comme l'annulation de la trace d'un élément de $\mathfrak{a}_F$ relativement au revêtement π de degré d.

Grâce à la fermeture des éléments de $\mathfrak{a}_F$ et par identification polynômiale, l'espace $\mathfrak{a}_F$ est uniquement déterminé par les solutions analytiques b_i du système différentiel linéaire homogène $\mathcal{M}(d)$ suivant :

$$\mathcal{M}(d)\ \begin{cases} \partial_x(b_d) & + \quad A_{1,1}\cdot b_3+\cdots+A_{1,d-2}\cdot b_d & = \ 0\\ \partial_x(b_{d-1})+\partial_y(b_d) & + \quad A_{2,1}\cdot b_3+\cdots+A_{2,d-2}\cdot b_d & = \ 0\\ & & \vdots \\ \partial_x(b_3)+\partial_y(b_4) & + \quad A_{d-2,1}\cdot b_3+\cdots+A_{d-2,d-2}\cdot b_d & = \ 0\\ \partial_y(b_3) & + \quad A_{d-1,1}\cdot b_3+\cdots+A_{d-1,d-2}\cdot b_d & = \ 0 \end{cases}$$

Concrètement, un système de Cramer où l'on reconnait le déterminant de Sylvester donnant le p-résultant de F permet de déterminer les coefficients A_{ij} dans $\mathcal{O}\,[1/R]$, et un calcul montre qu'ils sont en fait à pôles sur Δ. Ceci conduit d'ailleurs à une étude des tissus singuliers qui fait l'objet de travaux en cours.

Par la nature de ses symboles, les solutions analytiques de $\mathcal{M}(d)$ forment un *système local* dont nous sommes amenés à chercher le rang. Pour cela est construit à partir de $\mathcal{M}(d)$ grâce à la théorie de Cartan-Spencer un *fibré vectoriel complexe* E *de rang* π_d *sur* $(\mathbb{C}^2, 0)$, inclus dans le fibré des jets $J_{d-2}(\mathcal{O}^{d-2})$ et une *connexion* $\nabla\ : E \to \Omega^1 \otimes_{\mathcal{O}} E$*, non nécessairement intégrable, dont les sections horizontales s'identifient à* $\mathfrak{a}_F$. De plus, il existe une *base adaptée* de (E, ∇) telle que sa courbure K ait pour matrice

$$\begin{pmatrix} k_1 & k_2 & \dots & k_{\pi_d} \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} dx \wedge dy.$$

Le théorème de Cauchy-Kowalevski assure par conséquent que les tissus maximaux sont exactement ceux pour lesquels la connexion associée est intégrable. Dans le cas d'un 3-tissu, la courbure obtenue est une 2-forme qui est la *courbure de Blaschke* classique du tissu. Par construction, la connexion (E, ∇) dépend de la présentation F de $\mathcal{W}(d)$. Cependant, elle permet de déterminer d'autres invariants que le rang, comme nous allons le voir.

Dans toute la suite, on considère un d-tissu du plan non singulier $\mathcal{W}(d)$ présenté par une équation différentielle F de la forme (1), et dont on note la connexion associée (E, ∇) et la courbure K.

2 Trace de la matrice de courbure et autres invariants

Soit $P_{\mathcal{W}(d)}$ l'unique polynôme à coefficients dans $\mathcal{O}$ de degré inférieur ou égal à $d-1$ vérifiant pour tout $1 \leq i \leq d$ l'équation $P_{\mathcal{W}(d)}(x, y, p_i) = \partial_x(p_i) + p_i\partial_y(p_i)$. Les feuilles du tissu sont solutions de l'équation différentielle $y'' = P_{\mathcal{W}(d)}(x, y, y')$ et $\mathcal{W}(d)$ est linéaire si et seulement si $P_{\mathcal{W}(d)}$ est nul. Dans [3] est établi que $\mathcal{W}(d)$ est linéarisable si et seulement si $\deg(P_{\mathcal{W}(d)}) \leq 3$ et ses coefficients vérifient un système différentiel $L_1 = 0$ et $L_2 = 0$. Essentiellement par le calcul, on montre la proposition suivante :

Proposition 1.
(a) *Le polynôme* $P_{\mathcal{W}(d)}$ *est un invariant du tissu* $\mathcal{W}(d)$;
(b) *Les éléments* A_{ij} *du système* $\mathcal{M}(d)$ *s'expriment explicitement à partir des coefficients de* $P_{\mathcal{W}(d)}$*, et de ceux d'une forme de Pfaff dont la différentielle* $\kappa\, dx \wedge dy$ *est un invariant du tissu* $\mathcal{W}(d)$.

Par conséquent, on précise les résultats obtenus dans [4] concernant les *invariants* engendrés par le système $\mathcal{M}(d)$, et un calcul montre pour au moins $d = 4$ et 5, que les coefficients de la matrice de courbure sont des invariants du tissu.

L'écriture des coefficients A_{ij} en fonction notamment des coefficients du polynôme

$P_{\mathcal{W}(d)}$, permet aussi de retrouver, à la suite de I. Nakai (*cf.* [5]), pour un 4-tissu $\mathcal{W}(4)$ du plan non singulier, l'*équivalence* des trois propriétés suivantes :

1. *Pour* $1 \leq i \leq 4$, *les* 1*-formes* dF_i *définissant* $\mathcal{W}(4)$ *à un inversible de* $\mathcal{O}$ *près, vérifient la relation* $dF_i = s_i dF_1 + t_i dF_4$ *avec* s_i *et* t_i *distincts dans* $\mathbb{P}^1$;
2. *Les courbures de Blaschke des* 3*-tissus extraits de* $\mathcal{W}(4)$ *sont égales* ;
3. *Le birapport des quatre pentes* p_i *de* $\mathcal{W}(4)$ *est constant.*

Par ailleurs, on montre que de tels tissus ne sont *pas* linéarisables, sauf s'ils sont hexagonaux (*i.e.* les quatre 3-tissus extraits sont de rang 1)

• **Linéarisation des 4-tissus.** L'introduction du polynôme $P_{\mathcal{W}(d)}$ permet aussi dans le cas où $d = 4$ au moins, d'identifier plus précisément la courbure K, en montrant la proposition de linéarisation suivante :

Proposition 2. *Avec les notations précédentes et pour un* 4*-tissu* $\mathcal{W}(4)$, *il existe une base adaptée de* (E, ∇) *telle que la matrice de courbure dans cette base admette la forme suivante* :

$$\begin{pmatrix} 3\kappa & 3\partial_x(\kappa) + L_1 & 3\partial_y(\kappa) + L_2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} dx \wedge dy.$$

Par conséquent, et grâce aux propriétés générales de $P_{\mathcal{W}(d)}$ rappelées ci-dessus,

$\mathcal{W}(4)$ *est linéarisable si et seulement si, dans cette base,*
$k_2 = 3\partial_x(\kappa)$ et $k_3 = 3\partial_y(\kappa)$.

En fait, on montre dans le cas général que la matrice de courbure d'un tissu linéaire ne dépend que de κ et de ses dérivées partielles. Ainsi, on redémontre avec des méthodes propres aux systèmes différentiels, le théorème de Poincaré suivant : *Un* 4*-tissu du plan non singulier de rang maximal est linéarisable.*

• **Tissus rectifiés.** Traditionnellement, on peut préférer à la présentation implicite d'un tissu, la donnée d'un *tissu rectifié*, défini par les courbes de niveaux

$$(x, y, F_3(x, y), \ldots, F_d(x, y)).$$

Dans le cas non singulier, un changement de variables permet de se ramener à ce cas et les méthodes précédentes s'y appliquent et donnent le résultat suivant :

Proposition 3. *Pour un* 4*-tissu rectifié* $\mathcal{W}(4)$, *il existe une base adaptée de* (E, ∇) *telle que les coefficients de la matrice de courbure soient* :

$$k_1 = K_x + K_y + K_3 + K_4 \ ; \ k_2 = \partial_x(K_y) + v_3 K_y \ ; \ k_3 = \partial_y(K_x) - v_2 K_x$$

avec $P_{\mathcal{W}(4)} = -v_1 p^3 - v_2 p^2 - v_3 p - v_4$ *et où* K_x, K_y, K_3 *et* K_4 *désignent les courbures de Blaschke des* 3*-tissus extraits de* $\mathcal{W}(4)$ *indexées par la feuille retirée.*

En général, pour $d \geq 5$, cette simplicité n'est plus et les deux approches présentées se valent alors en complexité. On remarque dans la proposition précédente que la trace de K est la somme des courbures de Blaschke des 3-tissus extraits, ce que l'on va généraliser.

• **Sur la trace de la courbure de** (E, ∇)**.** En germe dans [4], et de façon analogue à la théorie de Chern-Weil, la trace $tr(K)$ de la courbure K se révèle d'une importance propre pour la géométrie du tissu $\mathcal{W}(d)$ et non pas seulement du fibré E. Comme nous l'avons montré pour le moment par un calcul pour au moins $d = 4, 5$ et 6, cette trace $tr(K)$ est un invariant de $\mathcal{W}(d)$ qu'on appellera la *courbure de Blaschke-Chern* de $\mathcal{W}(d)$, qui de plus, rend compte des 3-tissus extraits. En effet, on a le résultat suivant :

Théorème 1. (Formule de la trace)

Soit $\mathcal{W}(d)$ *un* d*-tissu non singulier du plan implicitement présenté par* F*, dont on note* (E,∇) *la connexion associée, et* K *sa courbure. On a alors l'égalité suivante* :

$$tr(K)=\sum_{k=1}^{\binom{d}{3}} d\gamma_k,$$

pour au moins $d=4,5$ *et* 6*, où les* $d\gamma_k$ *désignent les courbures de Blaschke des* 3*-tissus extraits de* $\mathcal{W}(d)$*.*

De façon équivalente, le fibré déterminant $(\det(E),\det(\nabla))$ associé à (E,∇) est donc isomorphe au fibré tensoriel des fibrés en droites $(\otimes L_i,\otimes\nabla_i)$ associés aux 3-tissus extraits.

3 Détermination du rang des tissus du plan : cas général

L'existence de bases adaptées de (E,∇) permet de donner un moyen effectif de détermination du rang.

On note $\gamma=\gamma_x dx+\gamma_y dy$ la matrice de connexion du tissu dans une base adaptée donnée et on considère la première ligne de la matrice de courbure dans cette base notée $k=(k_1,k_2,\ldots,k_{\pi_d})$. Les sections horizontales de la connexion ∇ notées

$$f={}^t(f_1,f_2,\ldots,f_{\pi_d})\in E^{\nabla}:=\mathrm{Ker}\,\nabla$$

qui s'identifient aux relations abéliennes du tissu, *via* l'espace $\mathfrak{a}_F$, vérifient le système différentiel $df+\gamma f=0$. La condition d'intégrabilité de ce système est donnée, grâce à la base adaptée, par la *seule* relation

$$k\cdot f=k_1f_1+k_2f_2+\cdots+k_{\pi_d}f_{\pi_d}=0 \qquad (2).$$

Ces considérations vont nous permettre de démontrer le théorème suivant :

Théorème 2. (Détermination du rang d'un tissu du plan)

Soit $\mathcal{W}(d)$ *un* d*-tissu du plan non singulier présenté par* F*, dont on note* (E,∇) *la connexion associée, munie d'une base adaptée. Il existe un fibré vectoriel* $\overline{K}$ *de rang* $rg\,\mathcal{W}(d)$*, noyau d'un endomorphisme de* $\mathcal{O}^{\pi_d}$, explicite, *tel que l'on ait*

$$\overline{K}=\mathcal{O}\otimes_{\mathbb{C}}E^{\nabla}.$$

En particulier, si l'on note $(k_{m\ell})$ *la matrice de cet endomorphisme, le rang du tissu est explicitement donné par l'égalité suivante* : $rg\,\mathcal{W}(d)=corang\,(k_{m\ell})$*.*

Démonstration. Elle utilise le lemme de Nakayama et fondamentalement que E^{∇} est un système local. On considère les π_d équations obtenues de la dérivation jusqu'à l'ordre $d-3$ de l'équation (2) où l'on pose $df=-\gamma f$. On obtient ainsi une matrice carrée $(k_{m\ell})$ d'ordre π_d à coefficients dans $\mathcal{O}$, dont la première ligne est k. Le $\mathcal{O}$-module $\overline{K}:=\mathrm{Ker}\,(k_{m\ell})$ est de type fini et par construction, l'inclusion $\mathcal{O}\otimes_{\mathbb{C}}E^{\nabla}\subseteq\overline{K}$ est vérifiée. Pour montrer la relation annoncée, il suffit de montrer que l'on a l'égalité

$$\overline{K}=\mathcal{O}\otimes_{\mathbb{C}}E^{\nabla}+\mathfrak{m}\cdot\overline{K}$$

en notant $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de $\mathcal{O}$. On considère des générateurs $(g_1,\ldots,g_r)$ de $\overline{K}$ tels que les $g_i(0)$ soient $\mathbb{C}$-linéairement indépendants. Soit $g\in\overline{K}$; le système précédent de générateurs permet de montrer que si $g(0)=0$, alors $g\in\mathfrak{m}\overline{K}$.

A l'aide du théorème de Cauchy et grâce à la construction particulière de la matrice $(k_{m\ell})$ issue de la dérivation de la condition d'intégrabilité (2), on montre que si $g(0) \neq 0$, il existe un germe de fonction analytique f dans E^{∇} telle que $f(0) = g(0)$. Ainsi, $g - f \in \overline{K}$ et vérifie $(g - f)(0) = 0$. Comme précédemment, le système de générateurs permet alors de montrer que $g - f \in \mathfrak{m}\overline{K}$, ce qui prouve l'égalité voulue entre $\mathcal{O}$-modules et donne une méthode explicite d'évaluation du rang. □

Par conséquent, un d-tissu non singulier $\mathcal{W}(d)$ du plan est de rang au moins 1 si et seulement si le déterminant de $(k_{m\ell})$ est nul. Ce *déterminant* est certainement un invariant du tissu $\mathcal{W}(d)$, comme cela a été montré dans le cas où $d = 4$.

Pour un 4-tissu et avec les notations précédentes, on vérifie que la matrice $(k_{m\ell})$ est de la forme

$$(k_{m\ell}) \;=\; \begin{pmatrix} k \\ \partial_x(k) - k \cdot \gamma_x \\ \partial_y(k) - k \cdot \gamma_y \end{pmatrix}$$

En écrivant explicitement la matrice $(k_{m\ell})$ dans ce cas, les résultats précédents permettent de montrer que *le rang d'un* 4-*tissu* $\mathcal{W}(4)$ *dont les courbures de Blaschke des* 3-*tissus extraits sont égales et non nulles vérifie l'inégalité* $rg\,\mathcal{W}(4) \leq 1$. On montre également qu'un 4-tissu de courbure de Blaschke-Chern nulle est de rang distinct de 2. Ceci nous permet par exemple de retrouver le résultat suivant :

Proposition 4. (G. Bol, cas $d = 4$) *Un* 4-*tissu hexagonal* $\mathcal{H}(4)$ *du plan est de rang maximal.*

Démonstration. Un tissu hexagonal $\mathcal{H}(4)$ admet quatre relations abéliennes à trois termes, dont deux sont nécessairement linéairement indépendantes donc $rg\ \mathcal{H}(4)$ vaut au moins 2. Or, sa courbure de Blaschke-Chern est nulle en vertu de la formule de la trace, donc $\mathcal{H}(4)$ ne peut être de rang 2, d'après la remarque précédente et par conséquent $\mathcal{H}(4)$ est de rang maximal. □

Références

[1] W. BLASCHKE und G. BOL, Geometrie der Gewebe, Springer-Verlag, Berlin, 1938.

[2] S. S. CHERN and P. A. GRIFFITHS, Abel's Theorem and Webs, Jahresber. Deutsch. Math.-Verein. **80** (1978), 13-110.

[3] A. HÉNAUT, Sur la linéarisation des tissus de $\mathbb{C}^2$, Topology **32** (1993), 531-542.

[4] A. HÉNAUT, On planar web geometry through abelian relations and connections, Ann. of Math. **159** (2004), 425-445.

[5] I. NAKAI, Curvature of curvilinear 4-webs and pencils of one forms : Variation on a theorem of Poincaré, Mayrhofer and Reidemeister, Comment. Math. Helv. **73** (1998), 177-205.

Olivier Ripoll

LaBAG, UMR 5467

351, cours de la Libération, 33405 Talence, France

Adresse e-mail : Olivier.Ripoll@math.u-bordeaux1.fr